

Módulo

7




RCP / RCPC / RCCCP

REANIMACIÓN CARDIO PULMONAR (RCP)

En caso de presentarse paro cardio-respiratorio debe iniciar el proceso de RCCP.

- ✓ Verifique la respiración.
- ✓ Verifique la frecuencia cardiaca.
- ✓ Verifique el estado de conciencia.
- ✓ Si no presenta respiración ni latido cardiaco y esta inconsciente proceda a colocar la víctima de espalda sobre una superficie dura y arrodíllese al lado.
- ✓ Despeje la vía aérea.

REANIMACIÓN CARDIO PULMONAR (RCP)



OBSTRUCCIÓN DE VIAS AÉREAS

ATRAGANTAMIENTO

La causa más frecuente de atragantamiento es la comida en adultos y los cuerpos extraños, en niños pequeños.

Tras un atragantamiento, nos podemos encontrar con dos situaciones:

- ✓ Obstrucción incompleta de las vías aéreas.
- ✓ Obstrucción completa de las vías aéreas.

REANIMACIÓN CARDIO PULMONAR (RCP)



Localización del punto de compresión torácico



Posición del socorrista

PRINCIPIOS BASICOS DEL RCP

- ✓ En caso de existir dos auxiliadores se realizaran cinco compresiones por un soplo.
- ✓ La reanimación se realiza hasta que el paciente presente nuevamente frecuencia cardiaca y respiratoria, o hasta que llegue personal médico o paramédico capacitado.

REANIMACIÓN CARDIO PULMONAR (RCP)

- ✓ Colocándose en posición de rodillas, con los brazos estirados y la manos juntas apóyese sobre la región precordial izquierda y comprima hacia abajo y con suavidad a razón de 80 veces por minuto.
- ✓ Brinde respiración artificial (boca a boca).
- ✓ En caso de que se encuentre solo realice ciclos de quince compresiones en el pecho y dos soplos para el adulto.

EMPLEO DEL D.E.A.

1

Encienda el equipo prestando atención a las instrucciones que éste indica.



EMPLEO DEL D.E.A.

Coloque los
parchos o paletas
en el pecho de la
víctima según las
instrucciones del
equipo.



2

EMPLEO DEL D.E.A.



Aleje a todos de la víctima mientras el DEA lo evalúa.

EMPLEO DEL D.E.A.

Una vez finalizada
la evaluación del
equipo, espere la
señal de
activación.



3

EMPLEO DEL D.E.A.

Alejando a todos de la víctima, aplique una descarga cuando el equipo se lo indique.



4

EMPLEO DEL D.E.A.




OBSTRUCCIÓN DE VÍAS AÉREAS

✓ OBSTRUCCIÓN COMPLETA DE LAS VÍAS AÉREAS

El sujeto se lleva las manos al cuello, sus labios y cara toman un color azulado (cianosis) y no puede hablar, ni toser.
Inmediatamente se debe realizar la *MANIOBRA DE HEIMLICH*



OBSTRUCCIÓN DE VÍAS AÉREAS





Inquietudes



Práctica RCP